



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»
(Алапаевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»)

Ленина ул., д. 125, корп. 1, г. Алапаевск, 624600
тел./факс (34346) 3-18-66
e-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru;
<https://fbuz66.ru/>
ОКПО 01901231; ОГРН 1056603530510;
ИНН/КПП 6670081969/668343001
№ 66-20-002-06/ 14- 1180 -2025
от 17.06.2025 г.

Статья: Ротавирусная инфекция

Многие думают, что кишечные инфекции – проблема экзотических стран с антисанитарными условиями, однако в случае ротавирусной инфекции это не так. Она распространена повсеместно. Заразиться ею легко, а последствия для здоровья могут быть очень тяжелыми.

Что нужно знать о ротавирусной инфекции? Как от нее защититься? Рассказываем в памятке.

Ротавирусная инфекция

повсеместно распространенное очень заразное вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта с развитием ротавирусного гастроэнтерита

Источник инфекции

больной человек или вирусоноситель

Механизм передачи — фекально-оральный

Заражение происходит при контакте с больным или вирусоносителем через грязные руки, объекты внешней среды, через третьих лиц (например, ухаживающих за больными), при употреблении загрязненной пищи и воды.

Симптомы

- Повышение температуры тела
- Рвота
- Диарея

Обезвоживание – основное осложнение ротавирусной инфекции

Обезвоживание очень опасно для маленьких детей.

Первые признаки обезвоживания – вялость (иногда наоборот, беспокойство), отсутствие желания играть, снижение объема мочеиспускания. Характерен «симптом пустого подгузника» – отсутствие мочи после 2-3 часов сна ребенка.

При появлении признаков обезвоживания у ребенка следует немедленно обратиться за медицинской помощью

Прогноз заболевания при адекватном лечении и достаточной компенсации потерь жидкости благоприятный, длительность болезни, как правило, не превышает 5-7 дней.

Вакцинация против ротавирусной инфекции

проводится в рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок.

Вакцины предназначены для иммунизации здоровых детей в возрасте от 6 недель до 32 недель с целью профилактики гастроэнтерита.

Вакцины предназначены для приема внутрь, содержат живые аттенуированные (ослабленные) штаммы ротавируса, которые, попав в организм, размножаются в тонком кишечнике человека.

Это приводит к формированию не только антител в крови, но и местного иммунитета в кишечнике.

Главный врач Алапаевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

М.С. Кабакова

Исполнитель: Корякова В.А. 8(34346) 3-19-23